FMC An Agricultural Sciences Company

PRÍPRAVKY NA JARNÉ OŠETRENIA

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.

Tripali®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

ÚČINNÁ LÁTKA	105 g/kg florasulam, 83 g/kg metsulfuron methyl, 83 g/kg tribenuron methyl
BALENIE	1000 ml HDPE fľaša s obsahom 250 g

Pôsobenie prípravku

Tripali® je trojzložkový herbicíd so systémovým účinkom. Metsulfuron methyl, tribenuron (sulfonylmočoviny) a florasulam (triazolopyrimidin) ako ALS inhibítory blokujú tvorbu esenciálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom. Prijímané sú listami rastlín a ničia väčšinu dvojklíčnolistových burín. Tripali® v krátkej dobe po aplikácii (do 6 hodín) zastavuje rast citlivých burín, účinok na buriny (zmena farby) sa prejavuje až za 1-3 týždne po ošetrení v závislosti na podmienkach rastu a citlivosti burín. Teplo a vlhko po aplikácii podporuje účinok prípravku. Chladné a suché počasie redukuje a oneskoruje účinok herbicídu. Najlepší účinok dosiahnete pri aplikácii na buriny v skorých rastových fázach. Prerastené buriny sú odolnejšie a odporúčame evidovať veľkosť jednotlivých druhov burín v dobe ošetrenia. Rovnomerné pokrytie porastu postrekovou kvapalinou je predpokladom spoľahlivého účinku.
Všetky tri účinné látky v Tripali® sú v obilninách rýchlo rozložené na herbicídne neaktívne metabolity a preto sú obilniny k účinným látkam v Tripali® vysoko selektívne.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: drchnička roľná, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, mrlík biely (2-6 listov), mak vlčí, pohánkovec ovíjavý (2-4 listy), pichliač roľný, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, veronika perzská, výmrv repky, lipkavec obyčajný, fialka roľná, fialka trojfarebná

Menej citlivé buriny: ľuľok čierny, prstovka krvavá, praslička roľná, pupenec roľný, mrlík biely a mrlík mnohoplodý (staršie rastliny - viac ako 6 listov), pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), veronika brečtanolistá, zemedym lekársky (2-6 listov)

Odolné buriny: loboda konáristá, veronika brečtanolistá (staršie rastliny viac ako 6 listov)

Odporúčané použitie

PLODINA	ÚČEL POUŽITIA	DÁVKA na ha	OCHRANNÁ DOBA
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale, ovos	dvojklíčnolistové buriny	50 g	AT

Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet ošetrení v roku: 1 x. **Aplikácia: BBCH 12-39**; jariny BBCH 12-39, oziminy 20-39; **ideálna aplikácia** v čase intenzívneho rastu burín. Množstvo aplikačnej kvapaliny: 200-400 l vody/ha.



VÝHODY PRÍPRAVKU

- Základný pilier v ochrane obilnín proti dvojklíčnolistovým burinám
- Široká registrácia
- Jednoduché dávkovanie
- Široké aplikačné okno (až po plne rozvinutý zástavnicový list)
- Jedinečný synergizmus troch účinných látok
- Použitie aj v tvrdej pšenici

Benefit Trendu 90

	TRIPALI® g/ha		TREND BENEFIT
burina	50	50 g + Trend	
MERAN (2)	100	100	0
SENVU (2)	100	100	0
SINAR (3)	100	100	0
STEME (20)	99	99	0
VERPE (6)	98	98	0
MYOAR (9)	100	100	0
POLCO (12)	98	98	0
LAMSS (13)	98	98	0
POLPE (2)	98	98	1
THLAR (16)	99	100	1
MATSS (24)	96	97	1
CAPBP (11)	99	100	1
ANTAR (4)	99	100	1
BRSNN (4)	97	98	1
GAETE (5)	97	99	2
CHEAL (17)	94	96	2
GALAP (30)	93	96	3
PAPRH (12)	96	99	3
GERSS (6)	94	97	4
VIOAR (32)	85	89	4
CENCY (18)	87	93	5
POLAV (7)	85	91	6
CIRAR (9)	84	92	8

Veľmi citlivé > 95 %
Citlivé: 85 až 95 %
Stredne citlivé: 75 až 85 %



Biplay® SX + Starane® Forte

Komerčný set cenovo zvýhodnených herbicídnych prípravkov vo forme vodorozpustných granúl a emulgovateľného koncentrátu na ošetrenie obilnín bez podsevu proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín vrátane rumanov, lipkavca a pichliača roľného.

ÚČINNÁ LÁTKA	222 g/kg tribenuron-methyl, 111 g/kg metsulfuron-methyl + 333 g/kg fluroxypyr
BALENIE	Biplay® SX 600 g + Starane® Forte 5 l

Pôsobenie prípravku

Tribenuron-methyl a metsulfuron-methyl sú sulfonylmočoviny so systémovým účinkom pôsobiace ako blokátory enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), ktorý je nepostrádateľný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (leucín, isoleucín a valín) v rastline. Veľmi rýchlo zastavujú rast citlivých burín s typickými príznakmi ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) do 3-10 dní po aplikácii. Fluroxypyr preniká do rastlín cez listy a účinná látka je rýchlo translokovaná. Účinok fluroxypyru na burine sa prejaví už za niekoľko hodín po aplikácii. Celkové prejavy účinku oboch prípravkov (deformácie rastových vrcholov, vybielenie, skrúcanie stoniek, deformácie listov a celých rastlín) sa prejavia už po 2 dňoch. V sete týchto 2 prípravkov je jedinečný synergizmus kombinácie 3 účinných látok (navyšovanie účinnosti – power effect) a postupné dopĺňanie pôsobenia účinných látok (káskádový efekt).

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, stavikrv vtáčí, nezábudka roľná, štiavce, kapsička pastierska, reďkev ohnica, horčica roľná, mrlík biely, hluchavka purpurová, mak vlčí, horčiak štiavolistý, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý, veronika perzská, láskavce, výmrv repky, výmrv slnečnice, zemedým lekársky, fialka roľná, viky, úhorník liečivý, kolenec roľný, ambrózia palinolistá.
Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), mrlík mnohoplodý (viac ako 6 listov), veronika brečtanolistá, vesnovka obyčajná, vesnovka brečtanolistá (viac ako 5 listov).

Odporúčané použitie*

Balíček Biplay® SX (600 g) + Starane Forte® (5 l) - TM aplikácia

PLODINA	DÁVKA PRÍPRAVKU		OŠETRENÁ PLOCHA Z 1 BALÍČKA	POZNÁMKA
	BIPLAY® SX na ha	STARANE FORTE® na ha		
ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ozimná raž, tritikale	40 g	0,3 l	15 ha	jar
jarná pšenica, jarný jačmeň, ovos	30 g 35 g	0,22 l 0,26 l	20 ha 17 ha	do 2 párov pravých listov burín

* Na základe dlhoročných a úspešných skúseností z praktického používania sa TM aplikácia odporúča v uvedených dávkach

Biplay® SX + Starane Forte® - ideálne riešenie na takto zaburinený porast obilnín

VÝHODY PRÍPRAVKU

- **Obzvlášť široké herbicídne spektrum**
- **Vysoká selektivita k obilninám**
- **Použitie v tvrdej pšenici**
- **Synergizmus (power effect) a kaskádový efekt**
- **Vysoká účinnosť na lipkavec, pichliač a problémové buriny**
- **Výhodné široké aplikačné okno - aplikácia do vlajkového listu**
- **Jedna z najviac odporúčaných kombinácií pre sladovnícke jačmene**
- **Možnosť aplikácie v kombinácií aj samostatne**

Pokyny pre aplikáciu

Termín aplikácie: od 2. listu obilniny do objavenia vlajkového listu, max 1x za vegetáciu.

Balíček Biplay® SX + Starane Forte® aplikujte v čase najväčšej citlivosti burín v ich počiatočnom raste, najlepšie do 2(4) párov pravých listov burín. Pri vyššom výskyte pichliača a mrlíkov je potrebné aplikovať min 40 g/ha prípravku Biplay® SX. Maximálna dávka prípravku Biplay® SX je 45 g/ha.

Biplay® SX + Starane Forte® je možné aplikovať v TM zmesi s DAM 390, ktorý zvyšuje celkový herbicídny účinok aj bez pridania zmáčadla Trend® 90.

Starane Forte® ničí lipkavec obyčajný vo všetkých jeho rastových fázach - pri vyššom výskyte a počte vytvorených praslenov lipkavca použite vyššiu dávku prípravku.

Zmáčadlo Trend® 90 (0,1 %) je potrebné pridávať len pri sólovom použití jedného z dvojice prípravkov v balíčku.

Odporúčané množstvo vody:
200 – 300 l/ha.

Cuadro® NT

Cuadro NT® je regulátor rastu a vývoja rastlín vo formulácii emulzného koncentrátu určený na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu a skrátenie stebla obilnín.

ÚČINNÁ LÁTKA	250 g/l trinexapac-ethyl
BALENIE	5 l HDPE/PA kanister

Pôsobenie prípravku

Účinná látka trinexapac-ethyl patrí do skupiny cyclohexandionov, ktoré pôsobia ako inhibítory enzýmov v biosyntéze kyseliny giberelínovej. Giberelíny sú rastové hormóny, ktoré podporujú predlžovací rast. Trinexapac-ethyl významne inhibuje ich syntézu, čím dochádza k spomaleniu predĺžovacieho rastu rastlín, k zhrubnutiu stebla a k podpore koreňového systému. Prípravok je prijímaný zelenými časťami rastliny a následne hydrolyzovaný na aktívny derivát, ktorý je translokovaný do meristematických pletív. Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy kyseliny giberelínovej, čo následne vedie k redukcii dĺžky internódií, čím sa znižuje celková výška rastlín a zvyšuje sa odolnosť proti poliehaniu.

Požadovaný efekt je možné dosiahnúť predovšetkým správnym načasovaním aplikácie. Skorý termím aplikácie (BBCH 29-33) výrazne skracuje spodné internódia, zosilňuje steblo a má pozitívny vplyv na tvorbu a rast koreňového systému. Mohutnejšie korene, ktoré siahajú do väčšej hĺbky dokážu rastline zabezpečiť efektívnejšie využitie vody a lepšiu prístupnosť k živinám. Neskorší termín aplikácie (BBCH 33-35 a neskôr) má vplyv hlavne na skrátenie horných internódií a na celkové zníženie výšky porastu.

Registrované použitie

PLODINA	ÚČEL POUŽITIA	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA
pšenica ozimná	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,4 – 0,5 l	AT
pšenica jarná	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT
jačmeň ozimný	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,5 – 0,6 l	AT
jačmeň jarný, ovos, raž, tritikale	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,4 – 0,6 l	AT

Vplyv termínu aplikácie Cuadro® NT na vývoj porastov obilnín

REGULAČNÝ ÚČINOK	chladnejšie počasie	priemerné teploty	teplé počasie
	odnožovanie (do BBCH 29)	steblovanie (do BBCH 35)	objavenie sa vlajkového listu (BBCH 37-39)
Posilnenie odnožovania	zvýšenie zimuvzdornosti vyšší úrodový potenciál		
Zvýšená tvorba koreňov	vyšší príjem vody a živín vyššia odolnosť proti suchu lepšia využiteľnosť živín		
Zvýšenie obsahu chlorofylu Vyššia vitalita Dlhšia vegetácia	intenzívnejšia fotosyntéza viac asimilátov vyšší úrodový potenciál		
Skrátenie stebla Spevnenie hrúbky stebla		vyšší podiel uhľohydrátov nižšia poliehavosť vyšší úrodový potenciál	
Zníženie výšky rastliny			spevnenie vrchnej časti stebla inzenzívnejšia fotosyntéza nižšia poliehavosť
Zníženie lámavosti klasu			zníženie zberových strát

- silný účinok - slabý účinok

VÝHODY PRÍPRAVKU

- **Ochrana porastov pred poliehaním**
- **Registrácia do všetkých druhov obilnín**
- **Flexibilný termín aplikácie**
- **Skrátenie internódií a zvýšenie hrúbky a pevnosti stebla**
- **Podpora koreňového systému – zlepšenie príjmu vody a živín**
- **Pozitívny vplyv na výšku a kvalitu úrody**
- **Efektívnejší zber obilnín aj následné spracovanie pôdy**

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

- Cuadro® NT je účinné už pri teplotách od 7 °C. Aplikácia pri vysokých teplotách (nad 25 °C) sa neodporúča.
- Nesmú sa ošetrovať rastliny stresované suchom, chladom, podmáčaním alebo inými nepriaznivými faktormi. Aplikácia sa má robiť na zdravý, aktívne rastúci porast.
- Porast pri aplikácii musí byť suchý. Ideálna je aplikácia pri silnom svite, za jasného alebo poloblačného počasia.
- Zrážky v priebehu 12 hodín po aplikácii môžu znížiť účinnosť prípravku.

Regulátor rastu a vývoja obilnín

- **na skrátenie stebla**
- **na spevnenie stebla**
- **proti poliehaniu**

Rombus® Power

NOVINKA

Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu obilnín proti chorobám stebiel, listov a klasov.

ÚČINNÁ LÁTKA	160 g/l prothioconazole, 300 g/l spiroxamine
BALENIE	5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Rombus® Power je kombinovaný fungicídny prípravok určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám stebiel, listov aj klasov. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom.

Registrované použitie

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA
pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, septorióza plevová, helmintosporióza pšenice	1,0 l	35 dní
pšenica ozimná	múčnatka trávová, steblolam, fuzariózy	0,75 l – 1,0 l	35 dní
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam, fuzariózy	1,0 l	35 dní

Možnosti použitia*

TERMÍN	SPÔSOB	DÁVKA (l/ha)	POZNÁMKA
T1 (BBCH 30-32/37)	sólo	0,75 - 1	TOP ochrana bázy stebla
T2 (BBCH 39-51/59)	sólo	0,9 - 1	komplexná ochrana
T2 (BBCH 39-51/59)	TM	0,5 + 0,5 Azaka®	+ posilnenie účinnosti na hrdzu + posilnenie preventívnej ochrany + green efekt

* Odporúčané možnosti použitia na základe interných pokusov FMC v Českej republike

Odporúčaná aplikácia



VÝHODY PRÍPRAVKU

- **Preventívny, eradikatívny aj kuratívny účinok**
- **Široké fungicídne spektrum**
- **Rýchly nástup účinku „stop efekt" na múčnatku**
- **Prienik aj do neošetrených častí rastliny (nových pletív)**
- **Spoľahlivý dlhodobý účinok**

Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x.
Množstvo vody: 200 – 400 l/ha, podľa typu aplikačného zariadenia a stavu porastu.

Pšenica ozimná:
Ošetrenie proti múčnatke trávovej, steblolamu a fuzariózam v dávke 0,75 l/ha vykonávajte pri zistení prvých príznakov infekcie od začiatku steblovania, kedy sa hlavné steblo a odnože vzpriamujú až do štádia zreteľného 1. kolienka (BBCH 30-31), v štádiu zreteľného 1. kolienka (BBCH 31) najneskôr do štádia konca odnožovania, pri objavení sa vlajkového listu (BBCH 37) ošetrenie vykonávajte v dávke 1,0 l/ha.

Pšenica ozimná, pšenica jarná:
Proti listovým a klasovým chorobám aplikujte preventívne alebo čo najskôr po zistení počiatočných príznakov choroby, od štádia, kedy je plodina na začiatku predlžovania stebla (vrchol klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom) (BBCH 30) až do štádia konca klasenia (BBCH 59).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný:
Ošetrenie vykonajte pri zistení prvých príznakov choroby od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30-51).

Prípravok Rombus® Power nie je určený na leteckú aplikáciu!

Azaka®

Širokospektrálny systémový fungicídny prípravok na ochranu pšenice ozimnej, pšenice jarnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného, ovsa, raže ozimnej, raže jarnej, tritikale, repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA	250 g/l azoxystrobin
BALENIE	5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok Azaka® obsahuje účinnú látku azoxystrobin. Azoxystrobin je QoI fungicíd – inhibítor viazania chinónov na cytochrómový bc1 komplex (FRAC skupina 7). Má systémové a translaminárne vlastnosti. Inhibuje mitochondriálnu respiráciu patogénov, čím pozastavuje klíčenie spór a rast mycélia. Účinkuje predovšetkým protektívne, preto musí byť použitý pred alebo na začiatku infekcie.

Registrované použitie

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA
pšenica jarná, pšenica ozimná	septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdze	1 l	AT
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	AT
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná	1 l	AT
ovos	hrdza ovsená, múčnatka trávová	1 l	AT
raž ozimná, raž jarná, tritikale	hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť, múčnatka trávová	1 l	AT
repka ozimná, repka jarná	čerň repková, biela hniloba	1 l	21 dní

Prípravok AZAKA má významný vedľajší účinok proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa v jačmeni ozimnom a jačmeni jarnom.

VÝHODY PRÍPRAVKU

- Široké spektrum účinnosti proti hubovým chorobám obilnín
- Dlhodobá ochrana porastov – zabraňuje vzniku nových infekcií po dobu 3-8 týždňov
- Zabezpečuje dlhodobo zelené porasty (tzv. green efekt) a predlžuje obdobie ukladania asimilátov
- Zvyšuje úrodu a HTZ

Sparta® 200 EC

Postrekový fungicídny prípravok vo formulácii EC určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, raži ozimnej, tritikale a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA	200 g/l tebuconazole
BALENIE	5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Sparta® 200 EC je systémový fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom. Účinná látka tebuconazole patrí do chemickej skupiny azolov, podskupiny triazolov. Pôsobí ako inhibítor biosyntézy ergosterolov v dvoch polohách metabolizmu, čo spomaľuje možnosť vytvárania rezistencie. Je prijímaná listami, stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhotrvajúci účinok. Účinná látka má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v obilninách proti chorobám listov a klasov: pšenica ozimná - múčnatka trávová (Erysiphe graminis), septoriózy pšenice (Septoria spp.), hrdze (Puccinia spp.), jačmeň jarný - múčnatka trávová, hrdza jačmenná (Puccinia hordei).

Registrované použitie

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	1 - 1,25 l	AT
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 - 1,25 l	AT
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1,25 l	56 dní

VÝHODY PRÍPRAVKU

- Riešenie na široké spektrum hubových patogénov v repke a obilninách
- Flexibilný termín aplikácie
- Široké možnosti použitia – sólo aplikácia, aj ako partner do kombinácií
- Morforegulačné vlastnosti v porastoch repky – regulácia výšky, zvýšenie odolnosti proti vyzimovaniu, zjednotenie kvitnutia a dozrievania porastov
- Zvýšenie produkcie a kvality úrody

HERBICÍDNY TANDEM DO KUKURICE

Successor® TX Nico Super® 240 SC

ODPORÚČANÁ KOMBINÁCIA

SUCCESSOR® TX 2 l/ha + NICO SUPER® 240 SC 0,17 – 0,25 l/ha

(dvojklíčnolistové buriny, jednoročné a viacročné trávy, pýr plazivý)

VÝHODNÝ BALÍČEK - SUCCESSOR TX PACK

4 l NICO SUPER® 240 SC + 40 l SUCCESSOR® TX

Účinnosť prípravkov Successor® TX + Nico Super® 240 SC na niektoré druhy burín

BURINNÝ DRUH	ÚČINNOSŤ	BURINNÝ DRUH	ÚČINNOSŤ	BURINNÝ DRUH	ÚČINNOSŤ
Ježatka Kuria	+++	Peniaztek roľný	+++	Mlieč drsný	+++
Ovos hluchý	+++	Žltnica maloúborová	+++	Pýr plazivý	+++
Lipnica ročná	+++	Zemedym	+++	Proso siate	+++
Mätonoh mnohokvetý	+++	Hluchavky	+++	Cirok alepský	+++
Láskavec ohnutý	+++	Drchnička roľná	+++	Mohár zelený	+++
Rumančeky	+++	Reďkev ohnicová	+++	Lipkavec obyčajný	+++
Parumančeк nevoňavý	+++	Horčica roľná	+++	Loboda konáristá	+++
Čistec roľný	+++	Výmrv repky	+++	Horčiak štvorlistý	+++
Hviezdica prostredná	+++	Pupenec roľný	++	Horčiak obyčajný	+++
Kapsička pastierska	+++	Durman obyčajný	++	Portulka zeleninová	+++
Fialka roľná	+++	Mlieč zelinný	+++	Bažanka ročná	+++
Výmrv slnečnice	+++	Durman obyčajný	+++	Veroniky	+++
Ľuľok čierny	++	Pohánkovec ovíjavý	++	Láskavce	+++
Moháre	++	Mrlíky	+++	Konopica	++
Podslnečník Theo.	+++	Pakosty	+++	Drchnička roľná	+++
Prstovka krvavá	++	Nezábudka roľná	+++	Úhorník liečivý	+++
Praslička roľná	++	Fialka trojfarebá	+++	Pichliač roľný	-

Coragen® 20 SC

Postrekový insekticíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu kukurice, jabloní, viniča a zemiaka proti žravým škodcom.

ÚČINNÁ LÁTKA	200 g/l chlorantraniliprole
BALENIE	1 l HDPE fľaša

VÝHODY PRÍPRAVKU

- Nová účinná látka - nový mechanizmus účinku - nové cieľové miesta v tele hmyzu
- Pôsobí ovicídne, ovicídno-larvicídne a larvicídne
- Výborná účinnosť na škodlivé organizmy, ale minimálne následky pre užitočný hmyz
- Výborná účinnosť aj na rezistentné populácie škodcov (napr. pásavka zemiaková)
- Prípravok vhodný na použitie aj v integrovanej ochrane rastlín
- Vstup do ošetreného porastu možný ihneď po uschnutí postrekovej kvapaliny

Steward®

Postrekový insekticíd vo forme dispergovateľných granúl na ochranu jadrovín, viniča, kukurice a kapustovej zeleniny proti žravým škodcom.

ÚČINNÁ LÁTKA	300 g/kg indoxacarb
BALENIE	1000 ml HDPE fľaša s náplňou 500 g

VÝHODY PRÍPRAVKU

- Účinná látka z novej skupiny insekticídov
- Prípravok vhodný do programu antirezistentnej ochrany
- Traslaminárne pôsobenie zabezpečuje ochranu celej rastliny
- Vysoká odolnosť prípravku proti zmytiu dažďom už 30 minút po aplikácii
- Spoľahlivosť aj pri rastúcich teplotách, ktoré naopak zvyšujú razanciu pôsobenia
- Povolený v integrovanej ochrane rastlín

ZVÝHODNENÉ PRODUKTOVÉ BALÍČKY NA JARNÉ OŠETRENIA

Azaka® 25 l + **Sparta® 200 EC** 40 l

Successor® TX 40 l + **Nico Super® 240 SC** 2 l

ZVÝHODNENÉ MNOŽSTEVNÉ BALÍČKY

Cuadro® NT 100 l + **Cuadro® NT** 15 l (1 za cent) — **15 % zľava**

Cuadro® NT 50 l + **Cuadro® NT** 5 l (1 za cent) — **10 % zľava**

Azaka® 50 l + **Azaka®** 5 l (1 za cent) — **10 % zľava**

REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA



Ing. Marcel Fabian
+421 903 265 501
marcel.fabian@fmc.com

Ing. Marián Macko
+421 948 979 399
marian.macko@fmc.com

Ing. Ladislav Závodský
+421 903 730 489
ladislav.zavodsky@fmc.com

Ing. Mária Lichvárová
+421 903 265 509
maria.lichvarova@fmc.com

Oddelenie logistiky
Mgr. Gabriela Kurucová
+421 903 705 838
gabriela.kurucova@fmc.com

Oddelenie registrácií
Ing. Dana Guljašová
+421 948 082 353
dana.guljasova@fmc.com

Riaditeľ
Ing. Gerhard Herda, Ph.D.
+420 725 753 783
gerhard.herda@fmc.com

FMC Agro Slovensko, spol. s r. o.
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Tel.: +421 2 48 29 14 59
Fax: +421 2 48 29 12 29