



An Agricultural
Sciences Company

NOVÉ PRODUKTY PRE ROK 2026

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.



Zvýhodnený balík: **DINIRO GOLD** na 40 ha
(Diniro® + Successor® TX + Istroekol®)

NOVINKA



VÝHODY PRÍPRAVKU

Diniro®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín a tráv v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA	40 g/kg prosulfuron, 400 g/kg dicamba, 100 g/kg nicosulfuron
BALENIE	1 kg

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: pýr plazivý, psiarka roľná, ježatka kuria, moháre (sivý, zelený), cirok alepský, lipnica ročná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), ambrózia palinolistá, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), durman obyčajný, pivojka plotná, pohánkovec ovijavý, pichliač roľný, podsľnečník Theofrastov, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, lipkavec obyčajný, žltica maloúborová, ibištek trojdielny, horčica roľná, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, fialky (roľná, trojfarebná), voškovník obyčajný, mlieč roľný, kapsička pastierska, hluchavky (objímavá, purpurová).
Stredne citlivé buriny: ľuľok čierny, pakost nízky, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, portulaka zeleninová.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	jednoročné a trváce dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,4 - 0,5 kg	AT	(TM) TREND 90

POKyny PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1 × za vegetačnú sezónu


Prípravok Diniro® poskytuje herbicídnu ochranu kukurice v širokom aplikačnom okne. Prípravok aplikujte v kukurici od rastovej fázy BBCH 12 (2. list vyvinutý) až do BBCH 18 (8. list vyvinutý).

Optimálny termín pre aplikáciu herbicídu Diniro® proti jednoročným trávam je štádium 2 – 4 listov. Proti pýru plazivému je najvhodnejšia aplikácia v období, keď je vzídených 90 % výhonkov pýru a dosahujú dĺžku 10 – 15 cm (3 – 4 listy). Najlepší účinok proti ciroku alepskému (vzchádzajúcemu z rhizómov) dosiahnete aplikáciou v štádiu, keď cirok dosiahne výšku 30 cm. Optimálny termín ošetrovania proti dvojklíčnolistovým burinám je štádium 2 – 4 pravých listov (BBCH 12 – 14).

Pri aplikácii je nutné vždy použiť herbicídny prípravok Diniro® v tank-mixe spolu s adjuvantom Trend® 90.

Nižšia dávka prípravku je vhodná v prípade nízkeho zaburinenia a pri aplikácii na ľahkých pôdach. Na silno zaburinených pozemkoch a na dostatočnú kontrolu ťažšie kontrolovaných burín ako ľuľok čierny, pakost nízky, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, portulaka zeleninová, pýr plazivý, psiarka roľná, cirok alepský, pivojka plotná a pichliač roľný použite dávku 0,5 kg/ha.

SCHÉMA OŠETRENIA KUKURICE



Komplexný postemergentný herbicíd za výbornú cenu – "3 v jednom"

Široké herbicídne spektrum – až 150 dvojklíčnolistových burín

Synergický efekt 3 účinných látok – dokonalý účinok na vzídené buriny

Razantné systémové pôsobenie na trváce a hlboko koreniace buriny

Možnosť medziriadkovej kultivácie (plečkovania) po aplikácii

Vynikajúca účinnosť na najproblematickejšie buriny v kukurici (cirok alepský, ježatka, moháre, durman, láskavce, pichliač, ambrózia, abutilon, voškovník, pupenec, horčiaci, ...)

Terbuthylazin free technológia



NAŠE ODPORÚČANIE

Aplikácia 5 účinných látok!

**Successor® TX 2 l/ha
+ Diniro® 0,5 kg/ha**

Lokality s Cirokom alepským - odporúčanie z Maďarska

- Ak je na ploche Cirok alepský (*Sorghum halepense*), postrekujte, keď dosiahne vývojovú fázu 10 – 20 cm.

- Opakované ošetrovanie.** V prípade, že vzchádzanie je **etapovité**, môže byť odôvodnené **druhé ošetrovanie**.

- Prvé ošetrovanie** načasujte podľa vývoja *Sorghum halepense* a aplikujte **0,5 kg/ha prípravku Diniro®**.

- Následne**, po 8 – 10 dňoch a po vzídení ďalšej vlny ciroku alepského, sa odporúča aplikovať na porast **0,17 l/ha herbicídu Nico Super®**.

Pridanie **0,1 % prípravku Trend® 90** je nevyhnutné pri oboch ošetrovaniach.



Množstevný balíček: **NUYARD® XL 20 I + 10 % ZĽAVA**
na 266 – 400 ha

Nuyard®

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC), určený na reguláciu výskytu živočíšnych škodcov v poľnohospodárstve a záhradníctve.

NOVINKA



VÝHODY PRÍPRAVKU

Široká registrácia do poľných plodín, ovocia aj zeleniny

Kontrola škodcov v porastoch repky

Kontaktný, požerový a významný repelentný účinok

Jednoduché dávkovanie

Účinkuje aj pri nižších teplotách

Možné tank-mix kombinácie s fungicídmi, herbicídmi a listovými hnojivami

Použitie tiež v systémoch šetrného hospodárenia

ÚČINNÁ LÁTKA	100 g/l deltamethrin
BALENIE	1 l

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Deltamethrin, účinná látka prípravku Nuyard®, je svetlостabilný syntetický pyrethroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín.

ODPORÚČANÁ APLIKÁCIA

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA /ha	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná, jačmeň ozimný	vektory viróz - vošky	50 ml	30 dní	jesenná aplikácia
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný	pestrička pšeničná	62,5 ml	30 dní	
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos	vošky	62,5 ml	30 dní	
repka ozimná	krytonos repkový, vektory viróz - vošky	62,5 ml	45 dní	
	blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, bylomor kelový, skočka repková	75 ml		
repka jarná, horčica	blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, bylomor kelový	75 ml	45 dní	
repa cukrová, kvačka, okrúhlica	scočky	75 ml	30 dní	
bôb, hrach	listárík čiarokvaný	75 ml	7 dní	
hrach	plodomor hrachový, obaloč hrachový, voška hrachová	62,5 ml	7 dní	
karfiol, kapusta hlávková, kel ružičkový	scočky, vošky, húsenice	75 ml	7 dní	
šalát	siatica ozimínová	62,5 ml	7 dní	
čerešne, višne	vrťvka čerešňová	75 ml	7 dní	
slnečnica	vošky	75 ml	60 dní	
zemiak	pásavka zemiaková	75 ml	7 dní	
kukurica	kukuričiar koreňový, mora bavlníková, víjačka kukuričná	125 ml	30 dní	

Nuyard® DUO



na 13 ha

Komerčný set insekticídnych prípravkov, ktorý sme pripravili ako výhodné riešenie ochrany repky proti stonkovým krytonosom a ďalším škodcom počas celej vegetácie s možnosťou použitia v množstve ďalších plodín.

Nuyard®

Alphamiprid® 20 SP

ÚČINNÁ LÁTKA	100 g/l deltamethrin
BALENIE	1 l

ÚČINNÁ LÁTKA	200 g/kg acetamiprid
BALENIE	4x300 g vodorozpuštná fólia WSB a potlačené PET/ALU/PE vrecko

ODPORÚČANÁ APLIKÁCIA

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE		OŠETRENÁ VÝMERA BALÍKOM
		NUYARD®	ALPHAMIPRID® 20 SP	
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, bylomor kelový	0,075 l/ha	100 g/ha	13 ha

Nuyard® DUO je primárne určený na ochranu repky ozimnej a repky jarnej pred stonkovými krytonosmi (krytonos repkový, krytonos štvorzubý). Prípravky obsiahnuté v tomto zvýhodnenom sete je však možné použiť taktiež na elimináciu ďalších škodcov repky olejnej ako na jar, tak aj v jesennom období. Oba insekticídy majú okrem repky širokú registráciu aj v ďalších plodinách.

Tripali® Komplet



NAŠE ODPORÚČANIE

**TRIPALI®
KOMPLET**

Tripali® 3 x 250 g + Pallas® 2 x 1 kg + Istroekol® 1 x 10 l

komplexné riešenie na ošetrovanie 15 ha obilnín
proti dvojkličnolistovým burinám a metličke

Tripali® 50 g + Pallas® 125 g + Istroekol® 0,66 l

Tripali®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl na postemergentné ničenie odolných dvojkličnolistových burín v obilninách.

ÚČINNÁ LÁTKA	105 g/kg florasulam, 83 g/kg metsulfuron methyl, 83 g/kg tribenuron methyl
BALENIE	1000 ml HDPE fľaša s obsahom 250 g

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: drchnička roľná, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, mrlík biely (2-6 listov), mak vlčí, pohánkovec ovíjavý (2-4 listy), pichliač roľný, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, veronika perzská, výmrav repky, lipkavec obyčajný, fialka roľná, fialka trojfarebná

Menej citlivé buriny: ľulok čierny, prstovka krvavá, praslička roľná, pupenec roľný, mrlík biely a mrlík mnohoplodý (staršie rastliny - viac ako 6 listov), pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), veronika brečtanolistá, zemedym lekársky (2-6 listov)

Odolné buriny: loboda konárístá, veronika brečtanolistá (staršie rastliny viac ako 6 listov)

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

PLODINA	ÚČEL POUŽITIA	DÁVKA na ha	OCHRANNÁ DOBA
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale, ovos	dvojkličnolistové buriny	50 g	AT

Pallas®

NOVINKA

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na postemergentnú aplikáciu v pšenici ozimnej, raži ozimnej a tritikale proti metličke obyčajnej a dvojkličnolistovým burinám.

ÚČINNÁ LÁTKA	75g/kg pyroxsulam
BALENIE	1 kg

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny (2 – 10 pravých listov): metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, fialka roľná, fialka trojfarebná, veronika perzská, veronika roľná, lipkavec obyčajný (iba jesenná aplikácia).

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný (jarná aplikácia).

Odolné buriny: hluchavka purpurová, zemedym lekársky, mak vlčí.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE*

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	0,125 kg	AT



VÝHODY PRÍPRAVKU

Základný pilier v ochrane obilnín proti dvojkličnolistovým burinám

Široká registrácia

Jednoduché dávkovanie

Široké aplikačné okno (až po plne rozvinutý zástavnicový list)

Jedinečný synergizmus troch účinných látok

Použitie aj v tvrdej pšenici

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet ošetrení v roku: 1 x.

Aplikácia: BBCH 12-39; jariny BBCH 12-39, oziminy 20-39; **ideálna aplikácia** v čase intenzívneho rastu burín. Množstvo aplikačnej kvapaliny: 200-400 l vody/ha.



VÝHODY PRÍPRAVKU

Jesenná aj jarná aplikácia v obilninách

Bez obmedzenia následných plodín

Kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, herbicídmi a kvapalnými hnojivami

Proti metličke na jeseň aj na jar

Tripali® + Pallas® ako komplexné riešenie na širokolistové buriny a metličku

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1 x.

Termín aplikácie je od 3. listu obilniny (BBCH 13), do 2. kolienka (BBCH 32) pri teplote +7 – +25°C, podľa rastovej fázy burín.

Toutatis® Pack



NAŠE ODPORÚČANIE

**TOUTATIS®
PACK**

Yanarox® 4 x 5 l + Command® 36 CS 1 x 2 l

balíček na ošetrovanie 10 ha

Yanarox® 2 l/ha + Command® 36 CS 0,2 l/ha

Yanarox®

NOVINKA



VÝHODY PRÍPRAVKU

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentráту pre riedenie vodou (SC) určený na preemergentné ničenie jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v zemiakoch, bôbe, hrachu krmnom a slnečnici ročnej.

Preemergentná aplikácia – dlhodobý reziduálny účinok

Široké herbicídne spektrum – 1 a 2-klíčnolistové buriny

Výhodné použitie pri pestovaní zeleniny

Yanarox® + Command® 36 CS – balíček pre kompletné herbicídne ošetrovanie

Povolenie v systémoch šetrného hospodárenia

ÚČINNÁ LÁTKA	600 g/l aclonifen
BALENIE	5 l

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: jednoročné trávy: metlička obyčajná, lipnica ročná, psiarka poľná dvojklíčnolistové buriny: rumančeky, hluchavky, horčica roľná, lýrovka obyčajná, kapsička pastierska, kolenec roľný, prhlava malá, láskavec ohnutý, loboda konáristá, mrlíky, peniažtek roľný, žltice, mliečniky, hviezdica prostredná, horčičky, veroniky, starček obyčajný, lipkavec, fialka roľná, výmrav repky, zemedym lekársky

Stredne citlivé buriny: lipkavec na silno humóznej pôde, pohánkovec ovijavý, pakosty a konopnica v prípade, že vzhádzajú oneskorene

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4,0 l	AT	
bôb	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4,0 l	AT	
hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4,0 l	AT	krmny
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4,0 l	AT	

Command® 36 CS

Preemergentný pôdny systémovo pôsobiaci herbicíd proti dvojklíčnolistovým burinám a niektorým jednoročným trávam v repke, zemiakoch, hrachu, sóji, tabaku, maku a tekvici.

ÚČINNÁ LÁTKA	360 g/l clomazone
BALENIE	2 l HDPE kanister



VÝHODY PRÍPRAVKU

Stabilita účinnosti

Nová formulácia - vyššia selektivita

Dlhý reziduálny účinok prípravku

Redukcia volatility účinnej látky

Široká registrácia

Absencia organických rozpúšťadiel

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka ozimná, repka jarná, zemiak, hrach, sója	lipkavec	0,2 - 0,25 l	AT	-
hrach	lipkavec	0,2 - 0,25 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrav obilnín, lipkavec	0,2 - 0,25 l + (1,2 - 1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC
		0,2 - 0,25 l + (1 - 1,2 l)	AT	(TM) Sultan 50 SC
		0,2 - 0,25 l + (2 l)	AT	Teridox 500 EC
		0,2 - 0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
tabak	dvojklíčnolistové, lipkavec	1 l	-	pásovo (1)
		1,2 - 1,5 l	-	výsev (3)



Zvýhodnený balík:
Zemeris® + Nuyard® (40 ha)



Zvýhodnený balík:
ZEMERIS DUO na 40 ha (Zemeris® + Gropper®)

Zemeris®

NOVINKA



VÝHODY PRÍPRAVKU

Porast obilnín už na jeseň bez burín

Dlhodobá reziduálna účinnosť až do jari (6 mesiacov)

Kontrola zaburinenia významných jesenných širokolistých burín a metličky

Použitie do 3 listov obilniny

Úspora jarnej herbicídnej aplikácie

ÚČINNÁ LÁTKA	500 g/l chlortoluron, 100 g/l diflufenican
BALENIE	5 l

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok ZEMERIS® obsahuje dve účinné látky, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Účinná látka Chlorotoluron (substituované močoviny) je absorbovaná koreňmi a listami rastlín, kde blokuje fotosyntézu. Účinná látka Diflufenican (karboxamidy/anilidy) je prijímaná najmä mladými rastlinami v období klíčenia, pri postemergentnej aplikácii je taktiež absorbovaná listami a je zodpovedná za blokovanie biosyntézy karotenoidov.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: metlička obyčajná, kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, hluchavky, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veroniky, fialka roľná, výmrav repky, jarmilka jarná, red'kev ohnicová, mak vlčí, pakost strihaný, ruman roľný.

Stredne citlivé buriny: zemedym lekársky, lipnica ročná, lipkavec obyčajný.

Odolné buriny: pichliač roľný, bocianik rozpukovitý, pýr plazivý, ovos hluchý.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,25 – 1,5 l	AT	Jeseň


POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.

ZEMERIS® aplikujte v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale na jeseň postemergentne v štádiu 1-3 listov plodiny (BBCH 11 – 13). Najlepšie výsledky dosiahnete v skorých vývojových fázach burín (dvojkličnolistové klíče až 2 pravé listy t. j. BBCH 10 – 12 a metlička 1-2 pravé listy t. j. BBCH 11 – 12).

SCHÉMA OŠETRENIA OBI LNÍN



Successor® TX

ROZŠÍRENÁ
REGISTRÁCIA
CIROK



VÝHODY PRÍPRAVKU

Postrekový preemergentný a postemergentný herbicíd vo forme suspenznej emulzie (SE) na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici a ciroku.

Účinnok na širokolisté aj trávovité buriny

Kontrola burín vzhádzajúcich vo vlnách

Účinnok na klíčiace buriny, cez korene aj listy burín

Zvlášť účinný na durman obyčajný

Pre- aj postemergentné použitie

Dlhodobý reziduálny účinok

Široká kombinovateľnosť

Rozšírená registrácia aj v ciroku

ÚČINNÁ LÁTKA	pethoxamid 300 g/l, terbuthylazine 187,5 g/l
BALENIE	10 l HDPE/PA kanister

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: Dvojklíčnolistové buriny - podsnečník Theophrastov, láskavec ohnutý, loboda konáristá, výmrav repky, kapsička pastierska, mrlík biely, durman obyčajný, bocianik, žltica maloúborová, lipkavec obyčajný, pakost, hluchavky, rumančeky, bažanka ročná, nezábudka roľná, horčičky, portulaka zeleninová, horčica roľná, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veroniky, fialka roľná

Trávy – aplikácia do fázy BBCH 09 (začiatok vzhádzania), lipnica ročná, ježatka kuria, mätonoh

Stredne citlivé buriny: ľuľok čierny, prstovka krvavá, praslička roľná, pupenec roľný

MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE

PLODINA	ÚČEL POUŽITIA	DÁVKA na ha	OCHRANNÁ DOBA	POZNÁMKA
cirok	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l	AT	preemergentne
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l	AT	postemergentne

Nico Super® 240 SC

Postemergentný herbicíd do kukurice proti jednoročným a trvácim trávam a niektorým dvojklíčnolistovým burinám a ciroku odolnému voči účinnej látke nicosulfuron.

ÚČINNÁ LÁTKA	240 g/l nicosulfuron
BALENIE	1 l HDPE/PA fľaša

ROZŠÍRENÁ
REGISTRÁCIA

CIROK

(odrody tolerantné voči
účinnej látke nicosulfuron)



VÝHODY PRÍPRAVKU

Jednoduchá manipulácia

Výborný partner do kombinácií

Spôľahlivé ničenie trávovitých burín

Účinnok aj na ďalšie dvojklíčnolistové buriny

V kukurici biologicky rozložený za 1 deň

Možnosť delenej aplikácie

Následné plodiny na jar bez obmedzení

Rozšírená registrácia do odrôd ciroku tolerantných na účinnú látku nicosulfuron

MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE

PLODINA	ÚČEL POUŽITIA	DÁVKA na ha	OCHRANNÁ DOBA
Cirok (odrody tolerantné voči účinnej látke nicosulfuron)	jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	0,17 l	AT
	pýr plazivý, dvojklíčnolistové buriny	0,25 l	AT

POKYNY PRE APLIKÁCIU V CIROKU

Maximálny počet ošetrení za rok: 1, odporúčané množstvo vody: 200 – 400 l/ha

Použite v štádiu 2-6 listov ciroku (BBCH 12 – 16). Ošetrenie v neskorších rastových štádiách môže spôsobiť zníženie herbicídnej účinnosti prípravku, pretože rastúci cirok môže listami prekryť buriny.

Optimálne rastové štádium burín pre aplikáciu herbicídu NICO SUPER® 240 SC sú 3 – 4 listy jednoročných tráv. Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzídených 90% výhonkov pýru v dĺžke 10 – 15 cm (3 – 4 listy).

Najlepší účinok dosiahnete pri aplikácii za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín. Herbicídny účinok môže byť zoslabený, ak bol prípravok aplikovaný za suchého a chladného počasia alebo ak je porast ciroku slabý alebo stresovaný. O herbicídnej účinnosti ošetrenia rozhoduje vývojová fáza burín a nie vývojová fáza ciroku.




ZVÝHODNENÉ PRODUKTOVÉ BALÍČKY 2026

PLODINA	PLOCHA	ZLOŽENIE BALÍČKA	MNOŽSTVO	DÁVKA / HA	ZĽAVA
kukurica	20 ha	Successor® TX + Haldis® SC	40 l + 10 l	2 l + 0,5 l	5%
zemiaky	10 ha	Vendetta® + Spotlight® Plus	5 l + 12 l	0,5 l + 1,2 l	
slnečnica Express Sun	15 ha	Express® 50 SX + Gramin®	0,675 kg (6 bal.) + 15 l	45 g + 1 l	
repka - insekticídny set	12 ha	NUYARD DUO (Alphamiprid® 20 SP + Nuyard®)	4x300 g + 1 l	100 g + 0,08 l	
repka - jeseň	30 ha	Gajus® + Nuyard®	90 l + 3 l	3 l + 0,08 l	
repka - jeseň	20 ha	Nero® + Nuyard®	60 l + 2 l	3 l + 0,08 l	
repka - jeseň	13 ha	GAJUS KOMPLET (Gajus® + Belkar)	3x10 l + 3 l	2,25 l + 0,25 l	
repka - jeseň	20 ha	Nero® + Nuyard® + Gramin® + Sparta® 200 EC	60 l + 2 l + 20 l + 25 l	3 l + 0,08 l + 1 l + 1,25 l	
hrach, zemiaky	10 ha	TOUTATIS PACK (Yanarox® + Command® 36 CS)	4x5 + 2 l	2 l + 0,2 l	
obilniny	15 ha	TRIPALI KOMPLET (Tripali® + Pallas® + Istreokol®)	3x250 + 2x1 kg + 10 l	50g + 125g + 0,66l	
obilniny - jeseň	40 ha	Zemeris® + Nuyard®	60 l + 2 l	1,5 l + 0,05 l	
obilniny - jeseň	40 ha	ZEMERIS DUO (Zemeris® + Gropper®)	60 l + 300 g	1,5 l + 7,5 g	
kukurica	40 ha	NICO FLEX (Nico Super® 240 SC+ Haldis®)	40 l + 10 l	1 l + 0,25 l	
kukurica	40 ha	DINIRO GOLD (Diniro® + Successor® TX + Istreokol®)	20 kg + 80 l + 30 l	0,5 kg + 2 l + 0,75 l	

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY Z PRÍPRAVKOV 2026

PLODINA	PLOCHA	PRÍPRAVOK	MNOŽSTVO	ZĽAVA	OBCHODNÝ NÁZOV
Obilniny/Repka	80 ha	Sparta®	100 l	10%	Sparta® XL
Repka/obilniny	266 – 400 ha	Nuyard®	20 l		Nuyard® XL
Repka & 2 kl. list. plodiny	50 ha	Gramin®	50 l		Gramin® XL
Repka	100 ha	Spodnam® DC	100 l		Spodnam® DC XL
Obilniny	125 ha	Cuadro® NT	50 l		Cuadro® NT XL
	250 ha	Cuadro® NT	100 l	15%	Cuadro® NT XXL
Obilniny/Repka	50 ha	Azaka®	50 l		Azaka® XL
Repka & 2 kl. list. plodiny	100 ha	Gramin®	100 l		Gramin® XXL
Repka/Mak	100 ha	Command® 36 CS	20 l		Command® 36 CS XL

REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA



Ing. Róbert Piroška
+421 903 265 501
robert.piroska@fmc.com



Ing. Marián Macko
+421 948 979 399
marian.macko@fmc.com



Ing. Ladislav Závodský
+421 903 730 489
ladislav.zavodsky@fmc.com



Jaroslav Jalcs
+421 903 265 509
jaroslav.jalcs@fmc.com



Oddelenie logistiky
Mgr. Gabriela Kurucová
+421 903 705 838
gabriela.kurucova@fmc.com



Oddelenie registrácií
Ing. Dana Guljašová
+421 948 082 353
dana.guljasova@fmc.com

Riaditeľ

Ing. Gerhard Herda, Ph.D.
+420 725 753 783
gerhard.herda@fmc.com

FMC Agro Slovensko, spol. s r. o.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Tel.: +421 2 48 29 14 59
Fax: +421 2 48 29 12 29